

Codone

Anas acuta Linnaeus, 1758



Ordine
Anseriformi

Famiglia
Anatidi

Genere
Anas

DISTRIBUZIONE - Il Codone è una specie migratrice diffusa in Europa, Asia e America nord-occidentale. L'areale di nidificazione delle popolazioni europee è compreso tra il 45° e il 70° parallelo di latitudine Nord, mentre le aree di svernamento si estendono dall'Europa centrale e occidentale fino all'Africa nell'intera fascia del Sahel. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si protrae da settembre a novembre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione si svolge da fine gennaio ai primi di aprile.

In Italia è migratore regolare e svernante. I contingenti in transito e svernanti nel nostro Paese hanno diversa origine: nelle regioni centro-settentrionali giungono individui dall'Europa centrale e settentrionale,

mentre le regioni meridionali sono interessate da individui di provenienza più orientale.

HABITAT - Frequenta ambienti acquatici ricchi di vegetazione sommersa e con bassi fondali dove può agevolmente trovare il cibo. Nelle aree di svernamento si insedia nelle zone umide costiere principalmente di acqua salmastra (estuari, lagune, saline) e sosta in mare non distante dalla costa, ma pure nei laghi interni e nelle casse di espansione fluviali.

COMPORTEMENTO - Di carattere timido e sospettoso, ma di indole socievole, conduce vita gregaria in branchi più o meno numerosi anche insieme ad altre anatre. Possiede un volo molto veloce con rapidi battiti d'ala, che producono un suono fischiante; è capace di alzarsi in volo dalla superficie dell'acqua quasi verticalmente. Buon nuotatore, immerge la testa e il collo sott'acqua alla ricerca del cibo, tenendo la coda abbassata. Sulla terraferma cammina con relativa facilità.

ALIMENTAZIONE - Si ciba in prevalenza di sostanze vegetali (piante acquatiche e terrestri, alghe, semi, ecc.), ma pure di Insetti e loro larve, Molluschi, Crostacei, vermi, piccoli Pesci.

RIPRODUZIONE - Nidifica in colonie su isolotti e dune sabbiose nelle lagune e negli specchi d'acqua costieri. Il nido viene predisposto in una depressione del terreno tra la vegetazione oppure in luoghi aperti. Nell'anno compie una sola covata e la deposizione delle uova ha luogo tra aprile e giugno. Le 7-9 uova deposte sono incubate dalla sola femmina per 22-24 giorni. I pulcini sono precoci e nidifughi e si rendono indipendenti all'età di circa 6-7 settimane.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole ed è ritenuta vulnerabile. La principale minaccia è rappresentata dalla perdita e trasformazione degli habitat sia nell'areale riproduttivo che in quello di svernamento.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Codone è specie: nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); oggetto di caccia (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18).

Mario Spagnesi