

Germano reale

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758



Ordine Anseriformi	Famiglia Anatidi	Genere <i>Anas</i>
-----------------------	---------------------	-----------------------

DISTRIBUZIONE - Il Germano reale è diffuso in Islanda, Europa, Asia centrale e America nord-occidentale. È una specie caratterizzata da popolazioni in gran parte migratrici ed alcune pressoché sedentarie o erratiche. Le popolazioni che estendono il loro areale riproduttivo nell'Europa settentrionale, centrale e orientale svernano più a Sud nell'Europa centro-meridionale fino alla Spagna ad occidente e, in particolare negli inverni più rigidi, lungo le coste del Nord Africa e in parte della Penisola Arabica.

In Italia è nidificante sedentario, migratore regolare e svernante. Tra la metà di ottobre e l'inizio di dicembre giungono nel nostro Paese i migratori da latitudini più settentrionali e orientali (Europa centro-orientale, Russia, Gran Bretagna, Scandinavia, Siberia orientale); essi ripartono verso i quartieri di nidificazione da fine gennaio a fine marzo.

HABITAT - Frequenta ambienti sia d'acqua dolce che salmastra di diversa ampiezza e tipo. In epoca riproduttiva preferisce specchi d'acqua non molto estesi, con bassi fondali e ricchi di vegetazione; durante l'autunno e l'inverno sosta anche in mare non distante dalla costa.

COMPORTEMENTO - Conduce vita gregaria tranne che durante la stagione delle cove. Possiede un volo rapido con battiti d'ala poco profondi ed è capace di alzarsi in volo dall'acqua quasi verticalmente. Sulla terraferma cammina abbastanza bene. Laddove è disturbato, si trattiene nelle distese di acqua aperte durante il giorno e si reca in pastura all'imbrunire e durante la notte.

ALIMENTAZIONE - Si ciba in prevalenza di sostanze vegetali (piante acquatiche e terrestri, alghe, germogli, semi, bacche, granaglie), ma pure di Insetti e loro larve, Molluschi, Crostacei, vermi, sanguisughe, girini, avannotti, piccoli Pesci.

RIPRODUZIONE - Il nido viene costruito con materiale vegetale dalla femmina sul terreno non lontano dall'acqua ove sia presente una buona copertura di piante erbacee o arbustive. Talvolta nidifica in cavità di alberi ad una certa altezza dal suolo. La deposizione delle uova ha luogo tra febbraio e l'inizio di luglio e nell'anno è possibile una seconda covata se la prima ha avuto esito negativo. Le 10-12 uova deposte sono incubate dalla sola femmina per 27-28 giorni dopo la deposizione dell'ultimo uovo, cosicché la schiusa è sincrona e in genere si completa entro 24 ore. I pulcini sono precoci e nidifughi e seguono la madre in acqua poco dopo la nascita.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa è considerata in uno stato di conservazione favorevole. Tra le anatre è la specie più diffusa ed abbondante e il numero di coppie nidificanti nella Regione Palearctica occidentale appare stabile. Del tutto criticabile e non priva di effetti negativi sulle popolazioni selvatiche è l'immissione in natura di soggetti di allevamento frutto di incroci con forme domestiche.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Germano reale è specie: nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); oggetto di caccia (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18).

Mario Spagnesi