

## Piovanello maggiore

*Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)



Ordine  
Caradriformi

Famiglia  
Scolopacidi

Genere  
*Calidris*

**DISTRIBUZIONE** - Il Piovanello maggiore è una specie migratrice a lungo raggio, che nidifica nella tundra circumpolare lungo la costa della Siberia centrale, in Groenlandia e in parte delle isole artiche canadesi. Le aree di svernamento delle popolazioni della Regione Neartica interessano l'Inghilterra e le coste meridionali del Mare del Nord, mentre quelle delle popolazioni della Siberia interessano l'Africa occidentale e meridionale. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge soprattutto tra agosto e l'inizio di ottobre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo tra maggio e l'inizio di giugno. Durante il volo di migrazione tra l'areale riproduttivo e quello di svernamento compie tratte ininterrotte assai lunghe, effettuando un limitato numero di soste.

In Italia è migratore regolare e in parte svernante. Mentre i contingenti in migrazione sono presenti un po' in tutte le zone costiere del nostro Paese, quelli che si fermano per trascorrere l'inverno sono localizzati nel Delta del Po e in Sardegna e il loro numero è inferiore alle 100 unità.

**HABITAT** - Nelle zone di riproduzione nidifica negli altopiani e nelle colline sassose prive di vegetazione e frequenta zone palustri anche lontane per alimentarsi; durante la migrazione e nelle aree di svernamento sosta lungo i litorali marini soggetti a escursione di marea, negli estuari fangosi e sabbiosi, nelle zone umide anche di ampiezza limitata.

**COMPORTEMENTO** - Ha abitudini nettamente gregarie. Possiede un volo rapido e potente e il branco compie evoluzioni coordinate mantenendosi abbastanza compatto. In branchi numerosi cammina nelle aree di alimentazione esplorando accuratamente il terreno per individuare le piccole prede. Appare piuttosto confidente nei confronti dell'uomo.

**ALIMENTAZIONE** - Si ciba di Invertebrati: Insetti e loro larve, Molluschi, Crostacei e Anellidi.

**RIPRODUZIONE** - La stagione riproduttiva è compresa tra giugno e luglio e nell'anno compie una sola covata. Il nido viene approntato in una depressione del terreno con licheni ed altre parti di piante presenti nella zona circostante. Le 3-4 uova deposte sono incubate sia dalla femmina che dal maschio per 20-25 giorni. I pulcini sono nidifughi e abbandonano il nido poco dopo la nascita. È soprattutto il maschio che accudisce la prole per circa 3 settimane.

**STATUS E CONSERVAZIONE** - La specie è considerata globalmente vulnerabile. Inoltre, è stato accertato un forte calo numerico delle popolazioni neartiche, apparentemente collegato ad una serie di stagioni riproduttive sfavorevoli.

**LIVELLO DI PROTEZIONE** - Il Piovanello maggiore è specie: nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157).

Mario Spagnesi