

Tordo sassello

Turdus iliacus Linnaeus, 1766



Ordine
Passeriformi

Famiglia
Turdidi

Genere
Turdus

DISTRIBUZIONE - Il Tordo sassello è una specie migratrice a lungo raggio o migratrice parziale, diffusa come nidificante alle alte e medie latitudini dell'Europa settentrionale e dell'Asia nord-occidentale, soprattutto nelle regioni sub-artiche e artiche. I quartieri di svernamento delle popolazioni migratrici europee interessano l'Europa occidentale e i paesi del bacino del Mediterraneo fino al Maghreb. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra la fine di settembre e novembre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione inizia a metà febbraio e si conclude a fine aprile.

In Italia è migratore regolare, svernante e nidificante irregolare. I contingenti che transitano e svernano nel nostro Paese originano per lo più dalla Penisola Scandinava e dalla Russia.

HABITAT - Frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide.

COMPORTEMENTO - Conduce vita gregaria, spesso anche con la Cesena, eccetto che nel periodo della riproduzione. Possiede un volo veloce e abbastanza diritto. Ricerca il cibo sul terreno nei campi e nel sottobosco, dove corre e saltella agilmente. Arboricolo, riposa sugli alberi e sui cespugli nascosto tra il fogliame. Fa udire un canto flautato piuttosto monotono, che può essere confuso, soprattutto all'epoca della riproduzione, con quello del Tordo bottaccio.

ALIMENTAZIONE - Si ciba principalmente di Insetti e loro larve, Molluschi, bacche e frutti selvatici.

RIPRODUZIONE - La stagione riproduttiva è compresa tra metà maggio e luglio. Nidifica nelle aree boschive e cespugliate, prediligendo foreste di betulle e ontani. Il nido viene costruito con materiale vegetale impastato con fango sia sugli alberi o nei cespugli sia sul terreno ai piedi di un albero o tra le radici di una pianta abbattuta. Nell'anno compie due covate. Le 5-6 uova deposte sono incubate per circa 13 giorni anche dal maschio. I pulcini sono nidicoli e vengono alimentati da entrambi i genitori per circa 2 settimane.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa è considerata in uno stato di conservazione favorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Tordo sassello è specie: nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); oggetto di caccia (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18).

Mario Spagnesi