

## Nibbio reale

*Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)



Ordine  
Accipitriformi

Famiglia  
Accipitridi

Genere  
*Milvus*

**DISTRIBUZIONE** - Il Nibbio reale è una specie migratrice diffusa dalla Svezia meridionale all'Ucraina e dall'Europa centrale al bacino del Mediterraneo occidentale e centrale. Le popolazioni dell'Europa settentrionale svernano più a Sud dell'area di nidificazione fino al bacino del Mediterraneo. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra la fine di agosto e settembre-ottobre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo da gennaio ad aprile.

In Italia è nidificante sedentario, migratore regolare e svernante.

**HABITAT** - Frequenta ambienti di pianura e di collina caratterizzati da ampi spazi aperti (pascoli, incolti, campi coltivati) alternati a zone alberate.

**COMPORTEMENTO** - La coppia vive probabilmente in monogamia permanente. Durante la stagione riproduttiva la coppia vive isolata ed ha un comportamento territoriale, mentre durante la migrazione e nelle aree di svernamento si riunisce coi conspecifici in gruppi di diverse decine di individui nei dormitori comuni sugli alberi. Ha un volo agile ed esplora il terreno per individuare le prede, compiendo planate ed acrobazie aeree. In genere ghermisce le prede a terra, per quanto sia in grado di catturare uccelli e insetti in volo.

**ALIMENTAZIONE** - Si ciba di Mammiferi di media e piccola mole, Uccelli, Rettili, Anfibi, Pesci, grossi Insetti, carogne e resti alimentari raccolti nelle discariche.

**RIPRODUZIONE** - Il nido, costruito con rami e sterpi cementati con terra e tappezzato con materiali vari, è posto su alberi d'alto fusto in una biforcazione del tronco principale. Nell'anno compie una sola covata e la deposizione delle uova ha luogo tra la fine di marzo e l'inizio di maggio. Le 2-3 uova deposte sono incubate per 31-36 giorni quasi esclusivamente dalla femmina, che viene sostituita dal maschio solo per brevi periodi. I pulcini sono nidicoli e nelle prime settimane di vita sono imbeccati dalla femmina col cibo procurato dal maschio. I giovani s'involano all'età di 50-55 giorni e poche settimane dopo il gruppo familiare si scioglie, abbandonando l'area di nidificazione.

**STATUS E CONSERVAZIONE** - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole, pur se segnalata in declino in Spagna, Portogallo ed Europa orientale.

**LIVELLO DI PROTEZIONE** - Il Nibbio reale è specie: nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II); particolarmente protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2).

*Mario Paganesi*