


Pittima minore

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)



Ordine
Caradriformi

Famiglia
Scolopacidi

Genere
Limosa

DISTRIBUZIONE - La Pittima minore è una specie migratrice a medio e lungo raggio, che nidifica a Nord del 65° parallelo nelle zone a clima artico e sub-artico dell'Europa (Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia), della Siberia settentrionale e dell'Alaska occidentale. L'area di svernamento della popolazione della Regione Palearctica occidentale è assai discontinua lungo le coste atlantiche dalla Gran Bretagna e dal Wadden Sea al Sud Africa. La migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra luglio e ottobre, mentre quella pre-riproduttiva verso i quartieri di nidificazione ha luogo tra marzo e maggio. Durante le migrazioni utilizza poche aree di sosta, quasi esclusivamente situate in zone umide costiere, intermedie tra le zone di riproduzione e quelle di svernamento, effettuando voli ininterrotti di 4-6.000 km.

In Italia è migratrice regolare di doppio passo in agosto-settembre e in aprile-maggio nelle principali zone umide costiere; è comunque poco comune.

HABITAT - Nelle zone di riproduzione frequenta la tundra e le zone acquitrinose al limite delle foreste di conifere; durante la migrazione e nelle zone di svernamento predilige le spiagge sabbiose e limose, le lagune, gli estuari.

COMPORTEMENTO - Conduce vita gregaria e spesso si associa ad altri limicoli di medie o grandi dimensioni. Possiede un volo veloce a rapidi battiti d'ala e il branco compie evoluzioni mantenendosi più o meno compatto. Sul terreno cammina agilmente. Si reca in pastura nelle acque basse e sui fondali che affiorano durante le fasi di bassa marea.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Insetti e loro larve, Crostacei, Molluschi e Anellidi.

RIPRODUZIONE - La stagione riproduttiva è compresa tra maggio e giugno e nell'anno compie una sola covata. Il nido viene predisposto con foglie, steli, fucelli e licheni in una cavità o depressione del terreno. In genere vengono deposte 4 uova, che sono incubate per 22-24 giorni sia dalla femmina che dal maschio. Entrambi i genitori si dedicano all'allevamento della prole.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - La Pittima minore è specie: nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III); protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157).

Mario Spagnesi