

Organetto

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)



Ordine
Passeriformi

Famiglia
Fringillidi

Genere
Acanthis

DISTRIBUZIONE - L'Organetto è una specie politipica diffusa in Europa ed Asia centro-settentrionale, e in Nord America con popolazioni sedentarie e migratrici. Nella Regione Palearctica occidentale l'areale riproduttivo comprende gran parte dell'Europa centro-settentrionale, per quanto risulti piuttosto frammentato. Le popolazioni migratrici in inverno raggiungono i paesi del Mediterraneo e il Mar Nero.

In Italia è distribuito in modo omogeneo su tutto l'arco alpino, soprattutto negli ambienti arbustivi di alta quota e nei boschi di larici.

HABITAT - Nelle zone di riproduzione frequenta le foreste di betulle e i boschi di ontani e salici, la tundra e, meno di frequente, i boschi di conifere, i parchi ed i giardini.

COMPORTEMENTO - Di indole gregaria e socievole, vive in piccoli gruppi, che alla fine dell'estate si riuniscono in branchi di centinaia di individui anche con altre specie (lucherini, fanelli e venturoni). È assai vivace e dimostra una spiccata abilità acrobatica, rimanendo sospeso a testa in giù sui rami più sottili. Possiede un volo agile e ondulato e sul terreno si muove saltellando.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di semi di betulla e di molte piante erbacee, samare degli olmi. I giovani sono alimentati con Insetti, loro larve e uova.

RIPRODUZIONE - Le coppie mantengono in genere un comportamento gregario e formano piccole colonie nidificanti. Più di rado la coppia nidifica isolatamente. L'accoppiamento è preceduto da un volo nuziale accompagnato da un canto caratteristico. Alla femmina è demandata alla costruzione del nido sui rami più bassi di un albero e verso la loro estremità, mentre il maschio si limita ad osservare il lavoro della compagna. Il nido è realizzato con rami secchi, piccole radici e licheni, e viene tappezzato con crini, peli, piumino e penne. Nell'anno compie due covate a partire dalla fine di aprile. Le 4-6 uova deposte sono incubate per circa 2 settimane dalla femmina, alla quale il maschio procura il cibo. I pulcini sono nidicoli e vengono accuditi da entrambi i genitori. I giovani abbandonano il nido all'età di 12-15 giorni.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa è considerata in uno stato di conservazione favorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - L'Organetto è specie: rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II); protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157).

Mario Spagnesi